

どうすればいいの？ポリオワクチン

単独の不活化ポリオワクチン導入（平成24年9月1日予定）から、4種混合ワクチン導入までの接種方法

ポリオワクチンを
まだ1回も
受けていない

生ポリオワクチンを
すでに1回
受けている

不活化
ポリオワクチンを
1～3回
受けている

生ポリオワクチンを
すでに2回
受けている

不活化ワクチンを
合計4回
受けてください

不活化ワクチンを
あと3回
受けてください

不活化ワクチンが
合計4回となるよう
残りの回数を
受けてください

不活化ワクチンは
必要
ありません

不活化ポリオワクチンは、
初回接種3回＋追加接種1回、
合計4回の接種が必要です。

生ポリオワクチンを1回接種
されている方は、合計3回の
不活化ポリオワクチン接種が
さらに必要です。

国内未承認の不活化ポリオ
ワクチンの接種を開始されて
いる方も、不足分を定期接種で
受けることができます。

生ポリオワクチンをすでに2回
接種されている方は、さらに
不活化ポリオワクチンを接種
する必要はありません。

★使用する不活化ポリオワクチンは、単独の不活化ポリオワクチンです。

★不活化ポリオワクチンは、初回接種として20日以上の間隔をおいて3回、追加接種として初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回、合計4回の接種が必要です。


★追加接種とは、生・不活化を問わず、全体を通して4回目となるポリオワクチンです。

★3種混合ワクチンは従来通り受けてください。

※平成24年9月1日の導入時点では、4回目の追加接種は定期接種対象外です（現在、国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定）。

どうすればいいの？ポリオワクチン

単独の不活化ポリオワクチン導入（平成24年9月1日予定）から、4種混合ワクチン導入までの接種ステップ



☆20日以上おいて（20日から56日までの間隔をおくことが望ましいです）

★6か月以上おいて（12か月から18か月の間隔をおくことが望ましいです）

※平成24年9月1日の導入時点では、4回目の追加接種は定期接種対象外です（現在、国内臨床試験を実施中のため、データが整い次第導入予定）。

